

Ere	M.a.*	Système (Période)	Sous-système (Epoque)	Etage	Types d'aquifères
Quaternaire					Aquifères alluviaux
Tertiaire / Cénozoïque	1,64	Néogène	Pliocène		Aquifères des sables rouges (placages)
	1,64		Miocène		Aquifère des faluns de Touraine et d'Anjou
	23,3	Paléogène	Oligocène		Aquifère des calcaires d'Anjou (localisés)
			Eocène Paléocène		Non aquifère
Secondaire / Mésozoïque	65	Crétacé	Supérieur	Sénonien	Aquifère du Séno-Turonien
				Turonien	Aquifère des sables du Cénomanién
				Cénomanién	
	145	Jurassique	Supérieur / MALM	Kimméridgien	Non dépôt
				Oxfordien	Non aquifère
			Moyen / DOGGER	Callovien	Non aquifère
				Bathonien Bajocien	Aquifère du Dogger (Calcaires)
			Aalénien	Non aquifère	
		Inférieur / LIAS	Toarcién	Non aquifère	
			Pliensbachien	Non aquifère	
208			Sinémurien		
245			Hettangien	Non dépôt	
Primaire / Paléozoïque		Permien			Aquifères de socle
		Carbonifère			
		Dévonien			
		Silurien			
		Ordovicien			
570		Cambrien			
Précambrien					Aquifères de socle